

INFORMACJA O ZAPOBIEGANIU CHOROBYM ZAKAŻNYM DLA POWODZIAN

**Służba sanitarno-epidemiologiczna ostrzega
POWÓDŹ sprzyja szerzeniu się
CHOROBY ZAKAŻNYCH.**

Woda rozniosła i osadziła na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzuszego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych. W glebie oraz w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należy zniszczyć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

W tym celu trzeba:

1. odkazić wapnem chlorowanym zalane powodzią studnie i ujęcia wodne,
2. oczyścić z osadów o odkazić przy użyciu chemicznych środków czyszczących powierzchnię ścian, podłóg i sprzętów gospodarczych,
3. wywietrzyć, wysuszyć i odmalować pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, zwłaszcza te, w których przechowuje się żywność i gdzie przebywają małe dzieci, osoby starsze, niepełne,
4. oczyścić, wysuszyć i odkazić miejsca ustępowe; często powtarzać odkażanie urządzeń sanitarnych i ustępów, zmywać je i utrzymywać w czystości i suchości.

Zakaźne schorzenia przewodu pokarmowego szerzą się poprzez zakażoną wodę, żywność i brudne ręce.

TYLKO RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY CHRONI PRZED ZACHOROWANIEM.

1. **WODĘ** do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia zębów należy **ZAWSZE GOTOWAĆ** przed użyciem.
2. Surowe produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób, jaja, ryby) oraz warzywa należy traktować jako zakażone i nie dopuszczać do ich zetknięcia z produktami gotowymi do spożycia, zwłaszcza gotowanymi i przeznaczonymi do spożycia na zimno lub przechowywania.
3. **RĘCE** myć dokładnie wodą z mydłem, czyszcząc również paznokcie po każdej bytności w ustępie, oporządzaniu zwierząt, oczyszczaniu warzyw oraz mięsa i jaj. To samo czynić przed przystąpieniem do: obróbki produktów przeznaczonych do spożycia, przygotowywania posiłków, karmienia dziecka, pielęgnowania niemowlęcia.
4. W razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać się jego zaleceniom.
5. W przypadku konieczności zastosowania szczepień ochronnych przeciw durowi brzuszemu należy jak najszybciej zgłosić się do odpowiednich punktów szczepień.

WYKAZ PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH I GRZYBOBÓJCZYCH

1. Preparaty do dezynfekcji narzędzi, sprzętu i powierzchni:

- Aerodesin 2000
- Lysoformin 3000
- Fugaten
- Incidur
- Sekusept Pulyer Classic
- Aktywator do Sekusept
- Aniosyme DD1
- Surtanios

2. Preparaty do dezynfekcji rąk i skóry:

- AHD 2000
- Majola.

3. W/w preparaty dostępne w:

REMEDIUM S.C. Joanna i Witold Barańczuk
62-600 Koło, ul. PCK 8 lok. 127
tel/tax 0-63-272-43-87.